

ບັນດາພະຍາດແມ່ກາຝາກ ທີ່ຕິດມາຈາກດິນ

ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ, ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ




ມີແມ່ທ້ອງ ຊະນິດໃດແດ່ ?



ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ

ແມ່ທ້ອງກົມອາໄສຢູ່ລຳໄສ້ອ່ອນ, ມັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 200 ມມ. ຖ້າມີແມ່ທ້ອງໂຕກົມຈຳນວນຫຼາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ຕັນໄດ້.



ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ

ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ມີຄວາມຍາວປະມານ 40 ມມ. ຖ້າມີແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ຈຳນວນຫຼາຍຈະມີຜົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງອິດ ແລະ ເປັນ ຖອກທ້ອງນຳອີກດ້ວຍ.



ຮູບຖ່າຍໂດຍອີເລັກໄມໂກສະແກນ

ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ

ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ມີຄວາມຍາວປະມານ 10 ມມ. ຖ້າມີແມ່ທ້ອງປາກຂໍຈຳນວນຫຼາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີອັນຕະລາຍຮ້າຍ ແຮງໄດ້. ພາໃຫ້ເດັກຂາດອາຫານ. ນຳຜູ້ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະນຳແມ່ມານສາມາດເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງຢ່າງຮ້າຍແຮງ



ພວກມັນອາໄສຢູ່ບ່ອນ ໃດແດ່ ?

ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ແລະ ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ອາໄສຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນເຮົາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ, ແຕ່ວ່າພວກມັນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາຈາກນອກສ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມາກ່ອນ.

ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ
ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ
ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ

ອາໄສຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນ



ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ ແລະ ແມ່ທ້ອງ ແສ້ມ້າ ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນເຮົາ ໄດ້ແນວໃດ ?



ເມື່ອມີຄົນເປັນພະຍາດແມ່ທ້ອງ
ໂຕກົມ ແລະ ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ໄປ
ຖ່າຍອາຈົມຊະຊາຍໃສ່ດິນ, ແລ້ວ
ໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ ກໍຈະຕິດ
ແລະ ຕົກອອກມາພ້ອມກັບອາຈົມ
ຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ .

ຖ້າຄົນມີແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃສ່
ວິດ ແຕ່ຫາກໄປຖ່າຍຊະຊາຍ (ຕາມ
ພູມໄມ້, ຕາມຕົ້ນໜ້ກ້ວຍ, ຖ່າຍໃສ່ສວນ
ຫຼື ຖ່າຍໃສ່ຕາມທົ່ງ ໄຮ່ທົ່ງນາ), ໄຂ່ຂອງ
ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ ແລະ ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ກໍ
ຈະແປດເປື້ອນໃສ່ດິນບໍລິເວນທີ່ຖ່າຍອາ
ຈົມຊະຊາຍ .



ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ
ແລະ ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ສາມາດ
ແປະເປື້ອນຕໍ່ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ
ເມື່ອຫາກເຮົານຳເອົາອາຈົມມາ
ໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນ



ເຄື່ອງປູກ ກໍຈະງອກງາມ
ເຊັ່ນຜັກຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າຢູ່
ຕາມກ້ານກິ່ງໃບ ຂອງຜັກ
ເລົ່ານີ້ກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍ
ໄຂ່ແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ .



ປະຊາຊົນຜູ້ອື່ນ ໆ ພາຍໃນບ້ານ
ແລະ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ທີ່
ຫຼິ້ນຕາມເດີນ ກໍຈະແປດເປື້ອນ
ເຕັມໄປດ້ວຍໄຂ່ແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ

ຕາມຕີນມີຂອງພວກເດັກ
ນ້ອຍເລົ່ານີ້ ກໍຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍໄຂ່ແມ່ທ້ອງ ຊຶ່ງເປັນ
ໜ່ວຍ ນ້ອຍ ໆ ຊຶ່ງເຮົາບໍ່ສາ
ມາດແນມເບິ່ງ
ເຫັນດ້ວຍຕາ
ເປົ່າ .



ຄົນເຮົາຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ກໍ
ໄດ້ກິນກິນໄຂ່ແມ່ທ້ອງ
ພວກນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສຳນຶກວ່າໄຂ່
ແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕິດຢູ່ກັບ
ອາຫານການກິນ ຊຶ່ງຕີນ ເອງໄດ້ກິນ
ເຂົ້າໄປ . ເມື່ອໄຂ່ແມ່ທ້ອງພວກນີ້ເຂົ້າໄປເຖິງລຳໃສ່ແລ້ວ
ພວກນັ້ນກໍຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ເປັນແມ່ທ້ອງໂຕ
ແກ່ . ແລະ ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງພວກຄົນທີ່ກິນກິນໄຂ່ດັ່ງກ່າວ ກໍ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດພະຍາດແມ່ທ້ອງກາຝາກລຳໃສ່ແລ້ວ .

ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ຕິດຕໍ່ໄດ້ແນວໃດ ?

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ພວກກາຝາກແມ່
ທ້ອງຂະນິດອື່ນ ໆ , ແມ່ທ້ອງປາກ
ຂໍຕິດຕໍ່ໄດ້ ໂດຍທີ່ຄົນເຮົາໄປຖ່າຍ
ໜັກຢ່າງຊະຊາຍຕາມດິນ ແລະ ບໍ່
ຖ່າຍໃສ່ວິດຖ່າຍ (ສົ່ວມຖ່າຍ)



ຢູ່ຕາມດິນ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍໄຂ່
ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ທີ່ໂຕແກ່ຂອງພະ
ຍາດປາກຂໍໄຂ່ອອກມາ ໄຂ່ແມ່
ທ້ອງປາກຂໍ ຖືກຟັກຢູ່ໃນດິນ ແລ້ວ
ແຕກ ອອກເປັນຕົວອ່ອນ (ຕົວ
ໜອນ) ແລະ ຕົວອ່ອນດັ່ງກ່າວ ກໍ
ຈະໄປຊື້ເຂົ້າຕາມຜົວໜັງຂອງຄົນ
ເຮົາ ແລ້ວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ .

ໂຕອ່ອນຂອງແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ສາ
ມາດຊື້ເຂົ້າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງໜັງຄົນເຮົາ ເມື່ອຖືກສຳຜັດ
ກັບຂີ້ຕົນທີ່ແປດເປື້ອນກັບພະ
ຍາດປາກຂໍ, ສ່ວນໃຫຍ່ ພະ
ຍາດປາກຂໍຈະຊື້ເຂົ້າໜັງຕີນ .
ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ
ແລ້ວ, ພະຍາດປາກຂໍຈະຜ່ານ
ເຂົ້າຫາປອດ, ລຳໄສ້ ແລ້ວກໍ
ເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ກາຍ
ເປັນແມ່ທ້ອງໂຕແກ່ .



ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ກໍ
ຈະຕິດພະຍາດປາກຂໍ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອ
ເຮົາຢ່າງດ້ວຍຕີນເປົ່າ. ຢູ່ໃນ ພາບນີ້ ພວກ
ເຮົາເຫັນຜູ້ຍິງ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ເກີບ (ຕີນເປົ່າ)
ກຳລັງເຮັດສວນ. ແມ່ທ້ອງປາກຂໍກໍ
ອາດຈະ ຊື້ເຂົ້າໜັງຕີນຂອງລາວໄດ້ .

ອາການຕ່າງ ໆ ຂອງຄົນ ທີ່ມີ ແມ່ທອງເປັນແນວໃດ ?

ໃນກໍລະນີ ຂອງ :

ການຕິດເຊື້ອແມ່ທອງແບບຮຸນແຮງ (ມີແມ່ທອງກາຝາກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ) :



ຈະປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ທອງ ໄດ້ແນວໃດ ?

ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີພະຍາດແມ່ທອງ ໃຫ້ໄປປຶກສານຳ
ແພດໝໍທັນທີ!

ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາ ໃນການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອພະຍາດແມ່ກາຝາກລຳໄສ້ .
ຄວນຈະຮັບຢາປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ທອງຈາກແພດໝໍ.
ຄູ່ກໍ່ສາມາດໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ທອງໄດ້ໃນ ກໍລະນີປິ່ນປົວ
ແບບເປັນຂະ ບວນການໃນໂຮງຮຽນ ຫຼືໃນບ້ານຂອງທ່ານ.

ຢາ ເມບັງດາໂຊນ

- ຢາ ເມບັງດາໂຊນ
(MEBENDAZOLE) :
ກິນ 500 ມລກ / ທຸກ ໆ
6 ເດືອນ .
- ຫຍໍ້ກ້ອນຢາກ່ອນກິນ.



ຈະປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອແມ່ກາຝາກ ທີ່ຕິດມາຈາກດິນໄດ້ແນວໃດ?

ທຸກໆຄອບຄົວຄວນມີ
ວິດຖາຍ,
ຖ້ຳປ່ໍມີວິດ
ຖ້າຍ, ເວລາ
ໄປຖ້າຍ
ຕ້ອງຊຸດດິນ
ຖິມ ແລະ
ໃຫ້ຫ່າງໄກ
ຈາກເຮືອນຢູ່



ວິທີປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງລຳໄສ້ທີ່ງ່າຍດາຍ ແມ່ນ
ຄວນຖ້າຍອາຈົມໃສ່ວິດຖາຍທຸກ ໆ ຄັ້ງ . ການໃຊ້ວິດ
ຖ້າຍ ເປັນວິທີຮັດສາອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ .

ຖ້ຳປ່ໍມີວິດຖ້າຍ ສຳລັບຖ້າຍອາຈົມ , ຕ້ອງໄປຖ້າຍໃຫ້
ຮ່າງໄກຈາກເຮືອນຢູ່, ຕ້ອງຊຸດຊຸມເພື່ອຖ້າຍອາຈົມໃສ່
ແລະ ເມື່ອຖ້າຍອາຈົມແລ້ວ ໆ ຕ້ອງຖິມດ້ວຍດິນໃຫ້ດີ

ຕ້ອງລ້າງມືຂອງທ່ານ ດ້ວຍສະບູ
ທຸກໆ ຄັ້ງຫຼັງຈາກອອກມາແຕ່ສັວມ
ຖ້າຍ ແລະກ່ອນຈະກິນອາຫານ .
ການລ້າງມືຈະຫຼີກເວັ້ນໄດ້ ເອົາໄຂ່
ແມ່ທ້ອງອອກຈາກມືຂອງທ່ານ .



ຈົ່ງລ້າງມື
ຂອງທ່ານ !!!!

ລ້າງຜັກໃຫ້ສະອາດ ແລະປອດໄພ : ຕ້ອງ
ລ້າງດ້ວຍນ້ຳຕ້ອງທີ່ໃສສະອາດ, ນ້ຳປະ
ປາ ຫຼື ນ້ຳຕົ້ມທີ່ສຸກດີແລ້ວຍິ່ງເປັນການດີ
, ຫຼືຄວນຕື່ມ ນ້ຳສົມ ໃສ່ເລັກໜ້ອຍ ຍິ່ງດີ
ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອກາຝາກ
ແລະ ໄຂ່ ແມ່ທ້ອງລຳໄສ້ .



ຈົ່ງລ້າງຜັກ ໃຫ້ສະອາດ ດ້ວຍນ້ຳ
ທີ່ສະອາດ !!!!

ຈົ່ງຕັດເລັບມື ແລະ ເລັບຕີນ ຂອງ
ທ່ານໃຫ້ສັ້ນ ໆ , ເພາະວ່າເລັບ
ຕີນ-ເລັບມືຍາວນັ້ນ ເປັນບ່ອນລີ້
ຊ່ອນ ຂອງໄຂ່ເຊື້ອແມ່ກາຝາກໄດ້



ຈົ່ງ ຕັດເລັບມື-ເລັບຕີນ
ຂອງທ່ານ !!!!

ທຸກ ໆ ຄັ້ງ ເມື່ອອອກມາ
ເຮືອນ ຕ້ອງໃສ່ເກັບສູບ ຫຼື
ເກັບແຕະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ຕີນຂອງທ່ານ ກະ
ທົບໂດຍກົງ
ກັບພື້ນ
ດິນ .



ຈົ່ງໃສ່ເກັບ ກ່ອນອອກຈາກ
ເຮືອນ !!!!





ອົງການອະນາໄມໂລກ
WHO

supported by the
"Direction de la Cooperation au
Developpement"
"Ministere des affaires Etrangeres"
Luxembourg



ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry of Health
Lao PDR



ສຶກສາທິການ